


# La Posologie

Lorsque le pDTG est pris avec l'ABC/3TC, pDTG et l'ABC/3TC ne nécessitent qu'une prise quotidienne.

Le nombre de comprimés de pDTG et d'ABC/3TC qu'un enfant doit prendre dépend de son poids. Voir le tableau à droite:

N'oubliez pas de donner à votre enfant ses médicaments contre le VIH chaque jour à la même heure.

Poids	Nombre de Comprimés Par Jour	
	pDTG	ABC/3TC 120/60 mg
3 à < 6kg	0.5 	1 
6 à < 10kg	1.5 	1.5 
10 à < 14kg	2 	2 
14 à < 20kg	2.5 	2.5 

## Administrez Le pDTG à Votre Enfant

Le pDTG et l'ABC/3TC pris en association ne nécessitent qu'une prise quotidienne. Ils peuvent être soit avalés en entier ou soit dispersés dans une petite quantité d'eau.

Pour administrer le pDTG et l'ABC/3TC ensemble dans l'eau:



1. Ajoutez le nombre adéquat de comprimés de pDTG et d'ABC/3TC en fonction du poids de votre enfant dans un verre propre et vide, puis ajoutez 2 à 4 cuillères à café d'eau propre.

Remarque: Si votre enfant ne prend pas d'ABC/3TC, ces recommandations peuvent être modifiées. Suivez toujours les conseils de votre professionnel de santé.



2. Remuez jusqu'à ce que le(s) comprimé(s) se dissolve(nt), et faites boire le mélange à l'enfant. S'il reste du médicament, ajoutez une petite quantité d'eau supplémentaire et donnez-la à l'enfant.



L'enfant doit boire toute l'eau immédiatement ou dans les 30 minutes qui suivent.

Remarque : Utilisez d'autres liquides ou aliments pour le mélange si votre enfant ne peut pas prendre les comprimés dans l'eau. Suivez les mêmes recommandations de volume que ci-dessus pour éviter les débordements et pour vous assurer que votre enfant consomme la dose entière.

## Les Effets Secondaires et Les Interactions Médicamenteuses

- Les effets secondaires provoqués par le pDTG est rare
- Le pDTG peut être pris sans danger avec la majorité des autres médicaments



Ces effets secondaires rares incluent:

- L'insomnie
- La fatigue et les maux de tête
- La nausées

Ils disparaissent généralement après un ou deux mois

Informez le professionnel de la santé en charge de votre enfant de tout autre médicament qu'il prend ainsi que des effets secondaires qu'il pourrait avoir après avoir pris du pDTG!

## Avez-vous entendu?

Un nouvel ARV amélioré pour les enfants vivant avec le VIH est disponible.

Les comprimés dispersibles de dolutégravir 10 mg pédiatrique (pDTG)

# Qu'est-ce que le dolutégravir (DTG)?



Le DTG est l'ARV privilégié pour tous les enfants et il est déjà utilisé chez les enfants 20 kg ou plus.

Le dolutégravir 10 mg pour enfant (pDTG) est une nouvelle formulation du DTG pour enfants d'au moins un mois et pesant entre 3 et 20 kg.

Le pDTG est généralement administré avec l'abacavir et la lamivudine (ABC/3TC).

pDTG peut être soit avalé en entier ou soit dispersé dans une petite quantité d'eau.

Avant tout pDTG a un goût crémeux à la fraise!



## Les Avantages



### EFFICACITE ACCRUE

Agit rapidement pour supprimer le virus



### SECURITE ACCRUE

Plus sûr et avec moins d'effets secondaires que les autres ARV



### ADMINISTRATION PLUS FACILE

Pris quotidiennement dans de l'eau ou avalé entier

## Passage au pDTG

Si votre enfant est déjà sous TAR et:

1. Au moins un mois
2. Pesant entre 3 et 20 kg

Ils peuvent être en mesure de passer au pDTG

Si vous pensez que votre enfant pourrait bénéficier de pDTG, veuillez en discuter avec votre professionnel de la santé!

