














































































Posologie	Galénique	Dosage	Image et Laboratoire	Recommandation de prise
COMBINAISON DE 3 MOLÉCULES				
DOLUTEGRAVIR + LAMIVUDINE + TENOFOVIR DISOPROXIL (DTG + 3TC + TDF)				
1 comprimé 1 fois par jour	 Comprimé	50/300/300 mg	 Cipla  Heterolabs  Macleods  Mylan/Viatris	Avec un repas même léger
EFAVIRENZ + LAMIVUDINE + TENOFOVIR DISOPROXIL (EFV + 3TC + TDF)				
1 comprimé 1 fois par jour	 Comprimé	400/300/300 mg	 Cipla  Heterolabs  Macleods  Mylan/Viatris	1 h avant ou 2 h après le repas, de préférence au coucher NE PAS couper, ni écraser
COMBINAISON DE 2 MOLÉCULES				
ABACAVIR + LAMIVUDINE (ABC + 3TC)				
1 comprimé 1 fois par jour	 Comprimé	600/300 mg	 Cipla  Heterolabs  Macleods  Mylan/Viatris  ViiV Healthcare	Avec ou sans repas NE PAS couper, ni écraser
EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL (FTC + TDF)				
1 comprimé 1 fois par jour	 Comprimé	200/300 mg	 Cipla  Heterolabs  Macleods  Mylan/Viatris	Avec un repas même léger
LAMIVUDINE + TENOFOVIR DISOPROXIL (3TC + TDF)				
1 comprimé 1 fois par jour	 Comprimé	300/300 mg	 Cipla  Heterolabs  Macleods  Mylan/Viatris	Avec un repas même léger
LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE (3TC + ZDV)				
1 comprimé 2 fois par jour	 Comprimé	150/300 mg	 Cipla  Heterolabs  Macleods  Mylan/Viatris  ViiV Healthcare	Avec ou sans repas
INHIBITEUR DE L'INTÉGRASE (II)				
DOLUTEGRAVIR (DTG)				
1 comprimé 1 fois par jour ou 1 comprimé 2 fois par jour (selon le profil viral)	 Comprimé	50 mg	 Cipla  Heterolabs  Mylan/Viatris  ViiV Healthcare	Avec un repas même léger
INHIBITEUR DE LA PROTÉASE (IP)				
ATAZANAVIR + RITONAVIR (ATV + RTV)				
1 comprimé 1 fois par jour	 Comprimé	300/100 mg	 Cipla	Avec un repas même léger NE PAS couper, ni écraser
DARUNAVIR + RITONAVIR (DRV + RTV)				
2 comprimés 1 fois par jour	 Comprimé	400/50 mg	 Heterolabs	Avec un repas même léger NE PAS couper, ni écraser
DARUNAVIR (DRV)				
2 comprimés 1 fois par jour boosté avec 100 mg de RITONAVIR	 Comprimé	400 mg	 Cipla	Avec un repas même léger
1 comprimé 2 fois par jour boosté avec 100 mg de RITONAVIR à chaque prise		600 mg	 Cipla  Mylan/Viatris	
1 comprimé 1 fois par jour boosté avec 100 mg de RITONAVIR		800 mg	 Mylan/Viatris	
LOPINAVIR + RITONAVIR (LPV + RTV)				
2 comprimés 2 fois par jour	 Comprimé	200/50 mg	 Heterolabs  Macleods	Avec un repas même léger NE PAS couper, ni écraser
BOOSTER				
RITONAVIR (RTV)				
Utilisé comme booster de chaque prise d'inhibiteur de protéase, c'est-à-dire pour augmenter la concentration des molécules prises en association	 Comprimé	100 mg	 Cipla  Heterolabs  Mylan/Viatris	Avec un repas même léger NE PAS couper, ni écraser

Posologie		Galénique	Dosage	Image et Laboratoire	Recommandation de prise
COMBINAISON DE 4 MOLÉCULES					
ABACAIVIR + LAMIVUDINE + LOPINAVIR + RITONAVIR (ABC + 3TC + LPV + RTV)					
3 kg - 5,9 kg	2 gélules 2 fois par jour	 Granules	30/15/40/10 mg	 Cipla	Ouvrir les gélules et verser les granules dans une petite quantité d'aliments mous (bouillie, compote...). Administrer en une seule fois sans broyer ou croquer les granules.
6 kg - 9,9 kg	3 gélules 2 fois par jour				
10 kg - 13,9 kg	4 gélules 2 fois par jour				
14 kg - 19,9 kg	5 gélules 2 fois par jour				
20 kg - 25 kg	6 gélules 2 fois par jour				
COMBINAISON DE 3 MOLÉCULES					
ABACAIVIR + LAMIVUDINE + DOLUEGRAVIR (ABC + 3TC + DTG)					
6 kg - 9,9 kg	3 comprimés 1 fois par jour	 Comprimé dispersible	60/30/5 mg	 Cipla	À avaler en entier avec de l'eau ou à dissoudre dans 10 mL d'eau (un petit verre d'eau) puis à administrer en une fois à l'enfant
10 kg - 13,9 kg	4 comprimés 1 fois par jour				
14 kg - 19,9 kg	5 comprimés 1 fois par jour				
20 kg - 25 kg	6 comprimés 1 fois par jour				
COMBINAISON DE 2 MOLÉCULES					
ABACAIVIR + LAMIVUDINE (ABC + 3TC)					
3 kg - 5,9 kg	1 demi comprimé 2 fois par jour (ou 1 comprimé en une seule prise)	 Comprimé dispersible	120/60 mg	 Cipla	À avaler en entier avec de l'eau ou à dissoudre dans 10 mL d'eau (un petit verre d'eau) puis à administrer en une fois à l'enfant
6 kg - 9,9 kg	1 demi comprimé matin, 1 comprimé soir (ou 1 comprimé et demi en une seule prise)				
10 kg - 13,9 kg	1 comprimé 2 fois par jour (ou 2 comprimés en une seule prise)				
14 kg - 19,9 kg	1 comprimé matin, 1 comprimé et demi soir (ou 2 comprimés et demi en une seule prise)				
20 kg - 25 kg	1 comprimé et demi 2 fois par jour (ou 3 comprimés en une seule prise)				
LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE (3TC + AZT)					
3 kg - 5,9 kg	1 comprimé 2 fois par jour	 Comprimé dispersible	30/60 mg	 Mylan/Viatris	Avec ou sans repas à dissoudre dans 10 mL d'eau
6 kg - 9,9 kg	1 comprimé et demi 2 fois par jour				
10 kg - 13,9 kg	2 comprimés 2 fois par jour				
14 kg - 19,9 kg	2 comprimés et demi 2 fois par jour				
20 kg - 25 kg	3 comprimés 2 fois par jour				
INHIBITEUR DE L'INTÉGRASE (II)					
DOLUTEGRAVIR (DTG)					
3 kg - 5,9 kg	1 comprimé 1 fois par jour	 Comprimé dispersible	5 mg	 ViiV Healthcare	À mélanger dans de l'eau (de 3 à 10 kg : 5 mL d'eau > 10 kg : 10 mL d'eau)
6 kg - 9,9 kg	3 comprimés 1 fois par jour				
10 kg - 13,9 kg	4 comprimés 1 fois par jour				
14 kg - 19,9 kg	5 comprimés 1 fois par jour				
20 kg - 25 kg	6 comprimés 1 fois par jour	 Comprimé dispersible	10 mg	 Mylan/Viatris	À avaler en entier avec de l'eau ou à dissoudre dans 10 mL d'eau
3 kg - 5,9 kg	1 demi comprimé 1 fois par jour				
6 kg - 9,9 kg	1 comprimé et demi 1 fois par jour				
10 kg - 13,9 kg	2 comprimés 1 fois par jour				
14 kg - 19,9 kg	2 comprimés et demi 1 fois par jour				
20 kg - 25 kg	3 comprimés 1 fois par jour	 Comprimé	50 mg	 Cipla	Avec un repas même léger
20 kg - 25 kg	1 comprimé 1 fois par jour			 Heterolabs	
				 Mylan/Viatris	
				 ViiV Healthcare	
				 ViiV Healthcare	
INHIBITEUR DE LA PROTÉASE (IP)					
LOPINAVIR + RITONAVIR (LPV + RTV)					
3 kg - 5,9 kg	2 sachets 2 fois par jour	 Sachet	40/10 mg	 Mylan/Viatris	Ouvrir le sachet et verser les granules dans une petite quantité d'aliments mous (bouillie, compote...). Administrer en une seule fois sans broyer ou croquer les granules.
6 kg - 9,9 kg	3 sachets 2 fois par jour				
10 kg - 13,9 kg	4 sachets 2 fois par jour				
14 kg - 19,9 kg	5 sachets 2 fois par jour				
20 kg - 25 kg	6 sachets 2 fois par jour				
10 kg - 14 kg	2 comprimés le matin et 1 comprimé le soir	 Comprimé	100/25mg	 Cipla	Avec ou sans repas NE PAS couper ni écraser
14 kg - 25 kg	2 comprimés 2 fois par jour			 Macleods	
25 kg - 35 kg	3 comprimés 2 fois par jour			 Heterolabs	

Un doute ?
Vérifiez les interactions médicamenteuses avec votre traitement ▶



Commandez gratuitement nos outils :
www.actions-traitements.org/commande
at@actions-traitements.org

Médicaments antirétroviraux

Version Afrique francophone 2024



Nous remercions particulièrement l'ensemble des associations partenaires africaines et des professionnels de santé qui ont permis la création de cette affiche. Les données sont tirées de la base de l'OMS ainsi que du DNDI.

